



# *Sacculina carcini* Thompson, 1836

## Sacculine

### Description

*Sacculina carcini* est un crustacé cirripède qui parasite les crabes. Il forme entre le thorax et l'abdomen de son hôte, une masse ovoïde jaune qui peut atteindre 2,5 cm. Sa surface est lisse ce qui permet de distinguer le parasite de la ponte d'un crabe, et présente une petite excroissance conique qui signale l'orifice cloacal. Cette masse protégée par une cuticule épaisse, contient les organes reproducteurs et sert de poche incubatrice. Elle devient brune à violet sombre lorsque les larves (nauplii) sont prêtes à en être expulsées. La sacculine est fixée dans la partie ventrale de son hôte par un pédicule qui se prolonge en un réseau de racines dans tout l'intérieur de l'hôte afin d'en capter les substances nutritives. Les crabes sont fortement affaiblis et leur croissance ralentie voire stoppée. Ce parasitage se révèle bien souvent fatal pour eux. Autre effet induit par la présence de la sacculine: la féminisation des individus mâles. Elle se manifeste notamment par un élargissement de l'abdomen. *Sacculina carcini* parasite les crabes verts, *Carcinus maenas*, plus rarement les étrilles, *Necora puber*, ainsi qu'un grand nombre d'espèces des genres *Liocarcinus*, *Bathynectes* et *Pirimella*.

### Espèces proches

Il existe dans les eaux européennes, huit espèces de sacculine qui parasitent des crabes. Chacune a son espèce de prédilection: par exemple, *Cancer pagurus* est parasité par *S. triangularis*, *Xantho pilipes* par *S. bourdoni* ...

### Auteur

Textes de Anne Bay-Nouailhat © 2008 - 2026



Baie de Concarneau, France, sur l'estran, 2008, WBN