



Chelidonichthys lastoviza (Bonnaterre, 1788)

Grondin strié

Description

Chelidonichthys lastoviza est un poisson osseux qui mesure jusqu'à 40 cm de long. Son corps est allongé et effilé sur l'arrière. Il possède deux nageoires dorsales. La première juste à l'arrière de la tête se dresse en forme de voile. Les nageoires pectorales sont grandes. Elles se déploient comme des ailes aux extrémités arrondies. Les trois premiers rayons de celles-ci sont libres et permettent au grondin strié de se déplacer sur le fond en 'marchant'. La tête possède un museau abrupt presque à la verticale. Sa couleur varie du brun-rouge clair au brun-rouge vif. Son corps est marqué de bandes plus ou moins larges légèrement en biais et de tâches plus claires ou plus foncées. Un liseré bleu ainsi que des tâches bleues colorent les nageoires pectorales. Le grondin strié peut émettre des grognements sourds grâce aux vibrations de sa vessie natatoire.

Distribution

Chelidonichthys lastoviza vit entre 1 et 150 m de profondeur en Atlantique, Manche, Mer du Nord et Méditerranée.

Auteur

Textes de Anne Bay-Nouailhat © 2006 - 2026



Rade de Brest, France, 10 mètres, 2014, www.mer-littoral.org © Wilfried Bay-Nouailhat



Rivière du Traux, France, 26 mètres, 2014, www.mer-littoral.org © Wilfried Bay-Nouailhat



Rivière du Traux, France, 26 mètres, 2014, www.mer-littoral.org © Wilfried Bay-Nouailhat